

Zona de inyección BRAZO




Zona de inyección GLÚTEO



Zona de inyección MUSLO



Zona de inyección ABDOMEN



De 2 a 4 cms
del radio
del ombligo



Recordar al paciente que:

- En los glúteos la inyección es segura sin realizar el pliegue
- Use agujas adecuadas a su complejión (generalmente entre 6-8 mm)
- Haga la inyección colocando la aguja perpendicular a la piel (90°)

Recordar al paciente que:

- Se lave siempre las manos y mantenga una buena higiene de la piel donde haya de inyectar la insulina con agua y jabón
- Haga rotación de las zonas de inyección para evitar hipertrofias (problemas en la zona subcutánea)
- Evite inyectarse en zonas de la piel que estén quemadas, enrojecidas, cicatrizadas o dañadas por inyecciones previas

Recordar al paciente que:

- La inyección debe hacerse en el tejido graso que está inmediatamente por debajo de la piel (tejido subcutáneo)
- Realice un pliegue con los dedos pulgar, índice y corazón, para asegurar que la inyección es subcutánea.
- Una vez inyectada la insulina, suelte el pliegue y espere 10" antes de retirar la aguja para evitar rebosamiento de la insulina.



SoloSTAR

SANOFI DIABETES



SoloSTAR

SANOFI DIABETES



SoloSTAR

SANOFI DIABETES